

PHOTO: STANSJE PLANTENGA



## Le parterre forestier

Les différentes espèces de fougères sont identifiées par la forme des feuilles (fronde) et la forme des fructifications (sores). Elles colonisent divers types d'habitats, des milieux les plus humides aux plus secs, en passant par les forêts denses et les milieux ouverts.

En regardant autour de vous, vous pouvez distinguer principalement deux espèces; la dennstaedtie à lobules ponctués et la fougère-à-l'aigle commune. La première, très délicate est représentative des sites ayant subi des coupes forestières. La seconde, plus robuste et plus grande, est courante dans les anciens pâturages. Ces deux espèces de fougères nous indiquent que la forêt dans laquelle nous nous trouvons a subi des changements dans les dernières décennies.

## The forest floor

Fern species are distinguished by the shape of their leaves (fronds) and their reproductive structures (sorus). Ferns populate various types of habitat, ranging from poorly drained soil to moist areas, and from dense woods to forest clearings.

Look around and you will see two common species: the Hay-scented fern and the Bracken fern. The first and most delicate is characteristic of sites where there has been forest cutting. The second, a more robust type, is most often found in abandoned fields. The presence of both shows us that this forest has undergone a great deal of change over the last decade.

PHOTO: STANSJE PLANTENGA



Ces panneaux ont été réalisés dans le cadre du projet de mise en valeur de la réserve naturelle des Montagnes-Vertes grâce à la participation financière de la

Conception :



La fiducie foncière de la vallée Ruitter

